

Novo registro estende a distribuição conhecida de *Synallaxis cinerascens* (Passeriformes: Furnariidae) para o norte

Marcelo Ferreira de Vasconcelos ¹, Ivana Reis Lamas ² e Mauro Guimarães Diniz ³

¹ Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Montes Claros, Avenida Dr. Rui Braga, s/nº, 39401-089, Montes Claros, MG, Brasil.

² Conservation International do Brasil, Avenida Getúlio Vargas, 1300, 7º andar, 30112-021, Belo Horizonte, MG, Brasil.

³ DITEC/Área de fauna, IBAMA-MG, Avenida Contorno, 8121, 30110-120, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Recebido em 12 de março de 2003; aceito em 30 de maio de 2003.

ABSTRACT. New record extends the known range of *Synallaxis cinerascens* (Passeriformes: Furnariidae) northward. We report the occurrence of and range extension for the Gray-bellied Spinetail (*Synallaxis cinerascens*) in a semi-deciduous forest fragment in São Pedro do Suaçuí municipality (18°20'S, 42°32'W), Minas Gerais, Brazil. One specimen was collected and it is deposited in the Coleção Ornitológica do Departamento de Zoologia of the Universidade Federal de Minas Gerais under the number DZUFMG 2976. The geographic range now extends 75 km north due to this sighting of *S. cinerascens*.

KEY WORDS: Atlantic Forest, Brazil, Furnariidae, geographic distribution.

PALAVRAS-CHAVE: Brasil, distribuição geográfica, Furnariidae, Mata Atlântica.

O João-teneném-da-mata (*Synallaxis cinerascens*) é uma espécie com distribuição nas regiões sudeste e sul do Brasil (de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul), norte do Uruguai, leste do Paraguai e nordeste da Argentina (Ridgely e Tudor 1994, Sick 1997). Aparentemente, o limite norte conhecido de sua distribuição seria a Serra do Caparaó, localizada entre as coordenadas 20°19' e 20°37'S e 41°43' e 41°53'W, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo (Sick 1997). Entretanto, Pinto (1978) citou a ocorrência da espécie para o Rio Doce, Minas Gerais, sem especificar uma localidade precisa. Este registro corresponde a um exemplar macho, coletado por W. Garbe em 1º de outubro de 1940, na Fazenda Boa Esperança, São José da Lagoa (19°45'S, 43°00'W), depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP 25602). Estranhamente, Pinto (1952) omitiu este espécime de sua 'súmula histórica e sistemática da ornitologia de Minas Gerais'. Além deste registro, Willis e Oniki (1991) observaram a espécie em Conceição do Mato Dentro (19°03'S, 43°22'W), Minas Gerais, sendo este o limite norte até então conhecido de sua distribuição geográfica. Nesta nota, apresentamos um registro de *S. cinerascens* efetuado ao norte de Conceição do Mato Dentro, ampliando sua área de ocorrência previamente estabelecida.

No dia 13 de janeiro de 2001, um exemplar macho de *S. cinerascens* foi coletado em um fragmento de mata semidecídua (18°20'S, 42°32'W), no município de São Pedro do Suaçuí, Minas Gerais. O espécime encontra-se

depositado na Coleção Ornitológica do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais, sob o número DZUFMG 2976. Este é o registro mais setentrional conhecido para *S. cinerascens*, ampliando sua distribuição cerca de 75 km para o norte.

Uma vez que a ocorrência da espécie tem sido constatada em áreas de Mata Atlântica localizadas na encosta leste da Cadeia do Espinhaço, em Minas Gerais (Willis e Oniki 1991, Vasconcelos 2001, Vasconcelos e Melo-Júnior 2001), é esperado que outras populações de *S. cinerascens* sejam encontradas em locais de mata semidecídua ao longo deste complexo montanhoso, especialmente na bacia hidrográfica do Rio Doce.

AGRADECIMENTOS

A J. F. Pacheco e dois revisores anônimos pela leitura crítica do manuscrito e ao Dr. L. F. Silveira por disponibilizar os dados do exemplar tombado no MZUSP.

REFERÊNCIAS

- Pinto, O. M. O. (1952) Súmula histórica e sistemática da ornitologia de Minas-Gerais. *Arq. Zool.* 8:1-51.
 _____ (1978) *Novo catálogo das aves do Brasil*. São Paulo: Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais.
 Ridgely, R. S. e G. Tudor (1994) *The birds of South America*, v. 2. Austin: University of Texas Press.

- Sick, H. (1997) *Ornitologia Brasileira*. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira.
- Vasconcelos, M. F. (2001) Adições à avifauna da Serra do Caraça, Minas Gerais. *Atual. Orn.* 104:3-4.
- Vasconcelos, M. F. e T. A. Melo-Júnior (2001) An ornithological survey of Serra do Caraça, Minas Gerais, Brazil. *Cotinga* 15:21-31.
- Willis, E. O. e Y. Oniki (1991) Avifaunal transects across the open zones of northern Minas Gerais, Brazil. *Ararajuba* 2:41-58.